

טיפול ביולוגי

Iressa (Gefitinib)

חשוב
לדעת!




מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט הטכניון חיפה

רקע

Iressa (gefitinib) היא תכשיר אנטי סרטני המיועד לטיפול בחולי סרטן הריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC=Non Small Cell Lung Carcinoma) וגידולים אחרים נוספים.

מנגנון פעולה

Iressa מעכבת את הטירוזין קינז של EGFR באמצעות קשירת ATP (אדנוזון טריפיספט) וזירחון עצמי (אוטופוספורילציה) של החלבון. מאחר שהזירחון חיוני להעברת אות על ידי החלבון לפנים התא, התרופה מעכבת את מסלול העברת הסיגנל של EGFR לגרעין התא ובכך היא עוצרת את התפתחות התאים הממאירים. התנאי למתן טיפול הוא קיום למוטציה EFGR ולכן יש לבצע בדיקת קיום המוטציה בתאי הגידול. אם זה מוטנטי, ניתן לתת טיפול ב-Iressa.



צורת מתן התרופה

- ▼ Iressa ניתנת בטבליות. כל טבליה מכילה: Gefitinib 250 mg.
- ▼ המינון המומלץ הוא טבליה אחת פעם ביום במרווחים קבועים.
- ▼ **יש לבלוע את התרופה עם מים בלבד!**
- ▼ הינך נדרש ליטול את התרופה במינון של _____ ליום.

מצבים הדורשים מעקב ודיווח לרופא:

- ▼ **בעיות בכבד** - בתקופת הטיפול, נדרשות בדיקות תפקודי כבד תקופתיות
- ▼ **בעיות ריאה** מסוימות עלולות להחמיר במהלך טיפול ב-Iressa
- ▼ **נטילת תרופות נגד קרישת דם**
- ▼ **רגישות ללקטוז** - היות והתרופה מכילה לקטוז
- ▼ **נטילת תרופות**
 - נוגדות קרישה
 - משתנות (ברביטורטים)
 - תרופות שינה (פניטואין/קרמזפין)
 - תרופות לאפילפסיה (ריפאמפיצין)
 - תרופות לשחפת (איטרקונזול)
 - תרופות לזיהומים פטרייתיים
 - תרופות לדיכאון וחרדה
 - תרופות להפחתת חומציות בקיבה, לכיב קיבה, להפרעות בעיכול ולצרבת.

תופעות לוואי שכיחות

- שלשול. ▼
- בחילות ו/או הקאות. ▼
- תגובות בעור כגון פריחה דמויית אקנה, לפעמים מלווה בגירוד, יובש ו/או סדקים בעור. ▼
- ירידה בתיאבון. ▼
- חולשה. ▼
- יובש/אודם/כיב בפה. ▼
- עלייה באינזים הכבד: אלנין אמינוטרנספראז בבדיקות הדם (ערך גבוה שלו מהווה סימן להפסקת נטילת התרופה). לעיתים תהייה גם עליה בבילירובין ובאנזים כבד אחר (אספרטאט אמינוטרנספראז). ▼
- שינוי ברמת הקריאטינין בדם. ▼
- שינוי בתהליך קרישת הדם. ▼

תופעות הלוואי אפשריות

- בעיות צפורניים. ▼
- דילול שיער. ▼
- יובש בריריות העשוי לגרום לאודם בלחמיות העיניים ו/או לדימום מהאף. ▼
- שתן דמי. ▼
- עליית חום. ▼
- חלבון בשתן. ▼

תופעות לוואי נדירות

- ▼ דלקת בלבב, שסימניה כוללים כאב חמור מאד בחלק העליון של הבטן, בחילה חמורה והקאות קשות.
- ▼ דלקת בכבד שסימניה יכולים להיות הרגשה כללית לא טובה עם צהבת או בלעדיה, עור צהוב או עיניים צהובות.
- ▼ דימום במערכת העיכול.
- ▼ זיהום כלי דם על פני העור, נראה כמו חבלה או פריחה.
- ▼ דלקת מדממת בשלפוחית השתן, תחושת שריפה ודחיפות בזמן מתן שתן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

- ▼ תגובות אלרגיות (בעיקר אם הסימנים כוללים נפיחות בפנים, בגרון או בלשון, קושי בבליעה וקושי בנשימה).
- ▼ קוצר נשימה קשה או החמרה פתאומית בקוצר נשימה ייתכן ומלווה גם בשיעול או בחום. חולים הנוטלים Iressa עלולים לפתח דלקת ריאות המכונה interstitial lung disease.
- ▼ דימום לא צפוי.
- ▼ התייבשות, הנגרמת כתוצאה משלשול חמור או ממושך, הקאות, בחילה או אובדן תאבון.
- ▼ בעיות עיניים כגון: כאב, אדמומיות או שינוי בראייה.
- ▼ בעיות קשות בעור (נדיר) הפוגעות בחלקים נרחבים של הגוף וכוללות אודם, כאב, כיבים ושלפוחיות.

שים לב !!!

- אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן שנקבע, עליך ליטול מנה מיד כשנזכרת כל עוד שזה לפחות 12 שעות לפני מועד נטילת המנה הבאה. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.
- אם נותרו פחות מ-12 שעות עד מועד נטילת המנה הבאה, אין ליטול את המנה שנשכחה.
- אין ליטול תרופות נוגדות חומצה (להפחתת רמת החומציות בקיבה), שעתיים לפני נטילת Iressa או שעה לאחריה.
- ניתן להוסיף את הטבליה לחצי כוס מים (לא מוגזים) מבלי לרסק אותה. יש לערבב עד להמסה של הטבליה כ-15 דקות ולשתות מיד. לאחר מכן, יש לשטוף את הכוס עם חצי כוס מים ולשתות שנית.
- יש ליטול את התרופה עם אוכל או בלעדיו.
- יש להמנע מאכילת אשכוליות ומשתיית מיץ אשכוליות. אכילת אשכולית בזמן נטילת התרופה מעלה את רמת התרופה והרעלים שבה בדם !

נא לשים לב לתאריך התפוגה של התרופה !

טופס מעקב במטופל המטופל ב-Iressa

תאריך: _____

שם המטפל: _____

תאריך התחלת טיפול: _____

מינון: _____ 1 X משקל: _____

בדיקות להמשך מעקב _____

PTT, PT	Creatinin	תשובות של תפקודי כבד	קוצר נשימה	מצבי העור (שינויים)

תופעות לוואי

שלוש	בחילות	הקאות	עייפות וחולשה	תאבון	מצב הפה	אחר

המלצות: _____

טופס מעקב במטופל המטופל ב-Iressa

תאריך: _____

שם המטפל: _____

תאריך התחלת טיפול: _____

מינון: _____ X 1 משקל: _____

בדיקות להמשך מעקב _____

PTT, PT	Creatinin	תשובות של תפקודי כבד	קוצר נשימה	מצבי העור (שינויים)

תופעות לוואי

שלוש	בחילות	הקאות	עייפות וחולשה	תאבון	מצב הפה	אחר

המלצות: _____

טופס מעקב במטופל המטופל ב-Iressa

תאריך: _____

שם המטפל: _____

תאריך התחלת טיפול: _____

מינון: _____ 1 X משקל: _____

בדיקות להמשך מעקב _____

PTT, PT	Creatinin	תשובות של תפקודי כבד	קוצר נשימה	מצבי העור (שינויים)

תופעות לוואי

שלוש	בחילות	הקאות	עייפות וחולשה	תאבון	מצב הפה	אחר

המלצות: _____

טופס מעקב במטופל המטופל ב-Iressa

תאריך: _____

שם המטפל: _____

תאריך התחלת טיפול: _____

מינון: _____ 1 X משקל: _____

בדיקות להמשך מעקב _____

PTT, PT	Creatinin	תשובות של תפקודי כבד	קוצר נשימה	מצבי העור (שינויים)

תופעות לוואי

שלוש	בחילות	הקאות	עייפות וחולשה	תאבון	מצב הפה	אחר

המלצות: _____

טופס מעקב במטופל המטופל ב-Iressa

תאריך: _____

שם המטפל: _____

תאריך התחלת טיפול: _____

מינון: 1 X _____ משקל: _____

בדיקות להמשך מעקב _____

PTT, PT	Creatinin	תשובות של תפקודי כבד	קוצר נשימה	מצבי העור (שינויים)

תופעות לוואי

שלוש	בחילות	הקאות	עייפות וחולשה	תאבון	מצב הפה	אחר

המלצות: _____

**הצוות האונקולוגי עומד לרשותך
לייעוצים טלפונים במקרים דחופים
גם מחוץ לשעות הפעילות**

**מנהלת המכון האונקולוגי:
ד"ר מריק יעל**

אחות אחראית:

חנוכה זיוה נייד: 052-3433188
טלפון בבית (במקרים דחופים): 04-6214064

לדוברי רוסית:

אחות אונקולוגית רייזמן אידה נייד: 057-7516272

עובדת סוציאלית:

צדוק מעיין נייד: 052-5287246

יחידה אונקולוגית לניאדו:

טל: 09-8604716, פקס: 09-8609252
שעות פעילות בימים א', ב', ג', ה'. בשעות: 08:00-16:00

בברכת החלמה מהירה!

© כל הזכויות שמורות לבית חולים לניאדו

נכתב על ידי גבי זיוה חנוכה, אחות אחראית במכון האונקולוגי, ב"ח לניאדו



מסוגני לבית הספר לרפואה ע"ש רות ובוחר רפפורט ▼ הטכניון חיפה

09-860-92-58 | 09-860-47-16 | oncolog@laniado.org.il

רחוב דברי חיים 16 קרית צאנז, נתניה | 09-860-46-66 | www.laniado.org.il