

הקזת דם

הצוות ההמטואונקולוגי עומד לרשותך
לייעוצים טלפונים במקרים דחופים
גם מחוץ לשעות הפעילות

מנהל המחלקה ההמטואונקולוגי:
ד"ר בולוויק שלמה

אחות אחראית:
גילי רות נייד: 057-7516418

עובדת סוציאלית:
צדוק מעיין נייד: 052-5287246

מזכירות:
טלפון: 09-8604736

בברכת החלמה מהירה!

נכתב על ידי גב' רותי גילי, אחות אחראית במחלקה ההמטואונקולוגית, בי"ח לניאדו
©זכויות שמורות לבית חולים לניאדו

חשוב
לדעת



היחידה אשפוז יום עומדת ארסוג המטופל והמלווה
פינא שגיה חמה/קרה.

אנו עושים ככל האפשר כדי להנעים את שהייתך במסגרת
הטיפול, ואקצר ככל האפשר את זמן שהייתך
במחלקה.

בהכבד המחלמה מהירה
צוות המחלקה המטולוגית



מהי הקזת דם ?

הקזת דם פירושה שאיבת דם בכמות של עד כ-500 סמ"ק .

הקזת דם מתבצעת כאשר יש צורך בהפחתה בנפח הדם - הורדת רמת ההמטוקריט וההמוגלובין במטרה להקל על עומס הלב ולמנוע התהוות קרישים, בעיקר פקקת ורידית עמוקה.

הסיבות לייצור מוגבר של כדוריות דם אדומות הם:

- ▼ **פוליציטמיה ראשונית** - נקראת גם פוליציטמיה ורה - מחלה במח העצם אשר מתבטאת בייצור מוגבר של כדוריות דם אדומות לא בשלות (אריטרוציטים) יחד עם לויקוציטים וטרומבוציטים לא בשלים. סיבת המחלה איננה לגמרי ברורה, אך חשיפה לקרינה ורעלים כימיים מסויימים מעלה את הסיכוי להתפתחות המחלה.
- ▼ **פוליציטמיה משנית** - בשל עישון כבד, השמנת יתר, מחלת ריאה כרונית, יתר לחץ דם.

הכנה

הפעולה מתבצעת במסגרת אשפוז יום המטולוגי. ביום הפעולה יש להגיע למחלקה לאחר ארוחת בוקר ושתיית שתי כוסות מים.

מה להביא ?

- ▼ מכתב הפניה מהרופא המטפל לביצוע הפעולה.
- ▼ טופס 17.

מהלך הפעולה

- ▼ מדידת לחץ דם ודופק.
- ▼ שתיית 4 כוסות מים.
- ▼ שכיבה על הגב במיטה/כורסה עד תום ההקזה.
- ▼ האחות תשים חוסם עורקים על הזרוע ותחדיר מחט לווריד הזרוע או האמה. המחט מחוברת לשקית עירויי דם ריקה שלתוכה מתנקז הדם (עד 500 סמ"ק).
- ▼ חוסם העורקים ישאר עד תום ההקזה.
- ▼ במהלך ההקזה האחות תבצע פעם נוספת מדידת לחץ דם ודופק.
- ▼ **חשוב לדווח על כל שינוי בהרגשתך !**

בסיום הפעולה

- ▼ בסיום הפעולה ישוחרר חוסם העורקים ותוצא המחט המחוברת לשקית. יש ללחוץ על מקום ההקזה לעצירת הדימום.
- ▼ הפעולה נמשכת כ 20-15 דקות.
- ▼ יש להשאר במיטה למשך 15 דקות לאחר סיום הפעולה.
- ▼ מדידת לחץ דם ודופק תבצע פעם נוספת לפני הקימה מהמיטה.
- ▼ הקימה מהמיטה לאט ובהדרגה.
- ▼ יש להרבות בשתיה ולהמנע מפעילות פיזית באותו יום.
- ▼ בעת השחרור תקבל הסבר על אפשרות להרגשת חולשה קיצונית. באם תופיע יש לפנות למוקד רפואי.
- ▼ הזמנה לבדיקת דם וביקורת רופא פעם בחודש.

