

הוראות לאחר תפירת/הדבקת פצע

חשוב
לדעת!



טלפונים: 09-8604630

09-8604624

פקס: 09-8609200

בברכת החלמה מהירה !

© כל הזכויות שמורות לבית חולים לניאדו



jrodrig@laniado.org.il | 09-860-46-30

www.laniado.org.il | 09-860-46-66 | רחוב דברי חיים 16 קרית צאנו, נתניה

יש לפנות מיד לשירות הרפואי כאשר:

- ▼ חום מעל 37.5° .
- ▼ הפרשה מאזור התפר/ההדבקה.
- ▼ לאחר התפירה/ההדבקה, האזור יהיה רגיש, אדום, נפוח וכאוב. במידה והתסמינים מעבר לסביר יש לפנות לרופא קופת חולים.
- ▼ במידה והתפר/ההדבקה נפתח, יש להגיע למיון מיידית.
- ▼ **במידה ומופיע דימום חזק באזור התפר/ההדבקה, עליך לפנות מיד לחדר מיון !**



בעשרים וארבע השעות הראשונות:

- ▼ ניתן לקחת תרופות נגד כאבים ע"פ הוראת רופא.
- ▼ אין להרטיב את התפרים/ההדבקה.
- ▼ יש להמנע, ככל האפשר, מהפעלת יתר של האזור.

לאחר עשרים וארבע שעות ראשונות:

- ▼ יש לשמור על ניקיון האזור התפר/המודבק. רחיצת האזור אך ורק על פי הוראות רפואיות.
- ▼ יש להמשיך מעקב לפי ההוראות במכתב השחרור.
- ▼ יש לפנות למרפאת קופת חולים לצורך מעקב או החלפת החבישה, אלא אם נאמר בפרוש אחרת.
- ▼ במידה וטופלת באנטיביוטיקה, יש להמשיך לקחת את התרופה באופן סדיר.