

ברונכיאווליטיס

רקע

ברונכיאווליטיס היא מחלה וירלית של דרכי האוויר ופוגעת בתינוקות קטנים בעונת החורף. מדובר בריבוי ליחה שחוסמת את דרכי האוויר הקטנים וגורמת למחלה חסימתית וקושי בנשימה.

הנחיות והמלצות

- מומלץ להשכיב תינוקות קטנים על גבם, ולהגביה את המיטה לזווית של 40 מעלות (גם בעגלה).
- אסור להשתמש בכרית! אפשר להגביה את המזרון ע"י שמיכה מגולגלת מתחתיו באזור הראש. בנוסף, מומלצת השגחה נשימתית צמודה גם במהלך שנת התינוק.
- מומלץ מתן ארוחות קטנות אך תדירות יותר, הכוללות הפסקות מרובות בעת האכלה. בתינוקות המטופלים בחמצן חובה להמשיך לתת חמצן לתינוק גם בעת האכלה.
- מתן חמצן - בהנחיית רופא באחד או יותר מהמקרים הבאים:
 - א. רמת חמצן נמוכה בדם (סטורציה) או בדיקות הגזים בדם מורות על הצורך - לעדות על חומרת המצב הקליני והנשימתי.
 - ב. המאמץ הנשימתי ניכר מתקשה בנשימה.
 - ג. הממצאים ההאזנתיים מחייבים לתת הנחיה לחמצן ניטור רמות בדם והדופק יתבצע ע"י האחיות לפי הוראת הרופא המטפל, וכן תערך מדידת חום.
- במידת הצורך יורה הרופא על ניטור קבוע ורציף ויקבע את סוג המוניטור הדרוש. אין לנתק התינוק מהמוניטור אלא בהוראה מפורשת של הרופא.
- בדיקות כמו : דם, שתן, צילומי חזה יתבצעו לפי הוראות הרופא.

אפשרויות למתן חמצן

החמצן יינתן דרך:

- צינורית המונחת בכניסה לאף (הנקראת משקפיים).
- דרך מסיכה.
- דרך HOOD (קופסת פלסטיק המונח מעל ראשון של הילד) הניטור מתבצע באמצעות חיישן מיוחד שמונח בתוך ה-HOOD.

כל שינוי בריכוז החמצן שניתנים לכל חולה, ובהתוויה לטיפול, יתבצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת וכתובה ע"י הרופא המטפל ורק ע"י צוות הרפואי.