

חבלת ראש

חשוב
לדעת



מיון ילדים

טל': 09-8604630

פקס: 09-8609320

דוא"ל: uymiun@laniado.org.il

אתר: www.laniado.org.il

בברכת החלמה מהירה !

© זכויות שמורות לבית חולים לניאדו



uymiun@laniado.org.il | 09-860-46-30

www.laniado.org.il | 09-860-46-66 | רח' דברי חיים 16, נתניה

במידה ומופיעה אחת מהתופעות דלהלן או במקרה של ספק יש לפנות **מיידית** לבדיקת רופא:

- ▼ הקאה.
- ▼ כאבי ראש מתגברים.
- ▼ שינה ממושכת, נמנום, ירידה במצב העירנות ו/או קושי בהערת הנפגע.
- ▼ ירידה בריכוז.
- ▼ בלבול.
- ▼ הופעת דימום או הפרשה מיימית מהאף, מהאוזן או מהגרונ.
- ▼ שינוי בהתנהגות.
- ▼ הופעת פירכוסים ו/או שיתוק.
- ▼ הופעת חום.
- ▼ פגיעה במערכת החושים, כגון: ראייה, שמיעה, ריח ושיווי משקל.

יש להביא דף זה לידיעת בן משפחה המתגורר או נמצא עם הנפגע על מנת לדאוג להבאתו לחדר מיון אם יופיעו אחד מהסימנים האמורים.

לא כל חבלת ראש מצריכה אישפוז בבית החולים או בדיקת הדמיה. עם זאת, בכל חבלת ראש דרושה עירנות להופעת סימנים או סימפטומים חדשים המצריכים בדיקה נוספת.

להלן ההוראות למשתחרר:

- ▼ מומלץ לנוח בבית ל-24 שעות לאחר השחרור. השכיבה במיטה איננה הכרחית אלא אם נאמר בפרוש אחרת.
- ▼ יש להשתמש בתרופות פשוטות בלבד נגד כאבים (אקמול או דומה לו) ולהמנע משתיית אלכוהול על מנת שלא לטשטש סימנים של שינוי במצב ההכרה.
- ▼ אין להשתמש בתרופות הרגעה או תרופות לשינה.
- ▼ על הנפגע להבדק ע"י רופא המשפחה במהלך השבוע הקרוב.

