

עירוני ברזל

הצוות ההמטואונקולוגי עומד לרשותך
לייעוצים טלפונים במקרים דחופים
גם מחוץ לשעות הפעילות

מנהל המחלקה ההמטואונקולוגי:
ד"ר בולוויק שלמה

אחות אחראית:
גילי רות נייד: 057-7516418

עובדת סוציאלית:
צדוק מעיין נייד: 052-5287246

מזכירות:
טלפון: 09-8604736

בברכת החלמה מהירה!

נכתב על ידי גב' רותי גילי, אחות אחראית במחלקה ההמטואונקולוגית, בי"ח לניאדו
©זכויות שמורות לבית חולים לניאדו

חשוב
לדעת!



היחידה אשפוז יום עומדת ארסוג המטופל והמלווה
פינת שגיה חמה/קררה.

אנו עושים ככל האפשר כדי להנעים את שהייתך במסן
הטיפול, ואקצזר ככל האפשר את מסן שהייתך
במחלקה.

בהכבד המחלמה מהירה
צוות מחלקה המטולוגיה



עירוי ברזל

עירוי ברזל פרושו מתן ברזל (Venofer, Ferlecit) דרך הוריד למטופלים הסובלים מירידה בריכוז הברזל בדם ובמאגרי הברזל בגוף. השימוש בעירוי נעשה לאחר שניתן טיפול בברזל דרך הפה ולא נראה שיפור או שהטיפול דרך הפה גרם לתופעות לוואי קשות.

רקע

הברזל הוא מרכיב חיוני בכדוריות הדם האדומות המאפשר להן לבצע את העברת החמצן מהריאות אל תאי הגוף. הברזל נמצא גם בתאי שריר לשימוש בזמן מאמץ. גוף האדם מקבל את הברזל מהמזון שאנו אוכלים. מאכלים עשירים בברזל כוללים: כבד, בשר אדום, פרות יבשים, דגים, עוף, קטניות, שומשום (טחינה), חלמון ביצה, אגוזי מלך ולחם מלא. מחסור בברזל גורם לאנמיה אשר תסמניה כוללים: חיוורון, עייפות, כאב ראש, דופק מהיר וקוצר נשימה במאמץ.

הסיבות לאנמיה מחוסר ברזל:

- ▼ הריון והנקה.
 - ▼ דיאטה או הפרעה בספיגה.
 - ▼ איבוד דם כרוני במחזור החודשי.
 - ▼ מחלות מערכת העיכול.
- אנמיה של חוסר ברזל נפוצה יותר אצל נשים מאשר בגברים, בפרט אצל נשים בהריון.

הכנה

עירוי ברזל מתבצע במסגרת אשפוז יום, אין צורך בהכנה מיוחדת ואין צורך להישאר בצום. ביום הפעולה יגיע המטופל למחלקה בשעה שנקבעה.

מה להביא ?

- ▼ טופס הזמנה לטיפול בברזל.
- ▼ מכתב הפניה מהרופא המטפל בצורך תשובות של בדיקות מקופ"ח.
- ▼ טופס 17.
- ▼ יש לרכוש את הברזל (Venofer, Ferlecit) בבית מרקחת של קופת החולים ולהביאו ביום הפעולה.

מהלך הפעולה

- ▼ החדרת ברנולה (מחט דרכה תקבל את מנת הברזל).
- ▼ לקיחת בדיקות דם לפי הצורך בהוראה רפואית.
- ▼ מדידת לחץ דם, דופק והערכת מצבו של המטופל ע"י הרופא והאחות המטפלת.
- ▼ מתן מנת ברזל דרך הוריד בטפטוף הדרגתי.
- ▼ מעקב אחר תופעות לוואי אפשריות.

במהלך מתן הברזל יש לדווח על כל שינוי בהרגשה

לדוגמא:

- ▼ הרגשת חום.
- ▼ בחילה והקאה.
- ▼ סחרחורת.
- ▼ חולשה.

אם מופיע אחד מהסימנים הנ"ל או יותר תופסק מנת הברזל. תבדק ע"י הרופא המטפל ותשקל האפשרות להמשיך או להפסיק את מתן הברזל.

בסיום הפעולה

- ▼ בסיום מנת הברזל תוצא הברנולה. יש ללחוץ על מקום הדקירה כ-60 שניות למנוע דימום או שטף דם מקומי.
- ▼ משך הטיפול הכולל הוא כשעה עד שעה וחצי.
- ▼ בעת השחרור יוסבר לך על האפשרות לתגובה אלרגית מאוחרת. באם תופיע, עליך לפנות למוקד רפואי.
- ▼ הזמנה לביקורת/טיפול נוסף. סה"כ תקבל בין 10-5 טיפולים. החלטה על מס' טיפולים תינתן ע"י הרופא בהתאם למצבך.

