

# עירוני דם

הצוות ההמטואונקולוגי עומד לרשותך  
לייעוצים טלפונים במקרים דחופים  
גם מחוץ לשעות הפעילות

**מנהל המחלקה ההמטואונקולוגי:**  
ד"ר בולוויק שלמה

**אחות אחראית:**  
גילי רות נייד: 057-7516418

**עובדת סוציאלית:**  
צדוק מעיין נייד: 052-5287246

**מזכירות:**  
טלפון: 09-8604736

**בברכת החלמה מהירה!**

נכתב על ידי גב' רותי גילי, אחות אחראית במחלקה ההמטואונקולוגית, בי"ח לניאדו  
© זכויות שמורות לבית חולים לניאדו

חשוב  
לדעת!



היחידה אשפוז יום עומדת לרשות המטופל והמלווה  
פינת שגיה חמה/קררה.

אנו עושים ככל האפשר כדי להנעים את שהייתך במסגרת  
הטיפול, ואקצרי ככל האפשר את זמן שהייתך  
במחלקה.

בהכבד המחלמה מהירה  
צוות מחלקה המטולוגיה



## מהו עירוי דם ?

עירוי דם פרושו מתן דם (כדוריות דם אדומות) למטופלים הסובלים מירידה בריכוז ההמוגלובין בדם (אנמיה).

ההמוגלובין הוא החלבון העיקרי המצוי בכדוריות הדם האדומות ותפקידו להעביר חמצן לכל רקמות הגוף. ירידה בריכוז ההמוגלובין גורמת בעיקר לעייפות, חולשה, סחרחורת וכאבי ראש.

ריכוז תקין של המוגלובין: יותר מ-13 ג' לד"ל בגברים,

ויותר מ-12 ג' לד"ל בנשים.

אצל מטופלים שריכוז ההמוגלובין שלהם הוא מתחת ל-10 גרם לד"ל (נשים וגברים כאחד) שוקל הרופא המטפל האם לתת מנת דם וזאת בהתחשב במצבו הרפואי של המטופל.

חשוב לזכור שלעירוי דם יכולות להיות תופעות לוואי רבות, ולכן תינתן מנת דם במקרים הכרחיים בהתאם למצבו של המטופל, ולשיקול דעתו של הרופא המטפל.

## הכנה

מתן עירוי דם מתבצע במסגרת אשפוז או אשפוז יום.

אין צורך בהכנה מיוחדת לפני הבדיקה ואין צורך להשאר בצום.

ביום הבדיקה יגיע המטופל למחלקה בשעה 8:00 בבוקר.

## מה להביא ?

▼ טופס הזמנה לבדיקה.

▼ מכתב הפניה מרופא המטפל.

▼ תעודה מזהה / במידה ומגיע ממוסד - צמיד זיהוי.

▼ מטופל המגיע ממוסד חייב במלווה.

▼ טופס 17.

## מהלך הפעולה

▼ החדרת ברנולה (מחט דרכה תקבל את מנת הדם) ולקיחת בדיקות דם.

▼ המתנה לתשובת ההמוגלובין בערך כ-30-40 דקות.

▼ מדידת חום, לחץ דם, דופק והערכת מצבו של המטופל ע"י הרופא והאחות המטפלת.

אם נמצא כי ריכוז ההמוגלובין גבוה מ-10 ג' לד"ל, ברוב המקרים ישלח המטופל לביתו עם הזמנה לבדיקה חוזרת בעוד 7-10 ימים. מועד ההזמנה יקבע ע"י הרופא המטפל.

אם נמצא כי ריכוז ההמוגלובין מתחת ל-10 ג' לד"ל - יחליט הרופא המטפל על הצורך במתן מנת דם.

משך מתן מנת דם הוא כ-90-120 דקות מרגע התחלת המתן. טרם התחלת מתן הדם תקבל תכשיר דרך הוריד למניעת תגובה אלרגית.

## במהלך מתן דם יש לדווח על כל שינוי בהרגשה

### לדוגמא:

▼ הרגשת חום

▼ כאב חד במקום העירוי

▼ צמרמורת

▼ כאב בגב או בית החזה

▼ פריחה על גבי העור

▼ סומק

אם מופיע אחד מהסימנים הנ"ל או יותר יופסק מתן הדם.

תבדק ע"י הרופא המטפל ותשקל האפשרות להמשיך או להפסיק את מתן הדם.

## בסיום הפעולה

▼ בסיום מנת הדם תקבל תכשיר משתן דרך הוריד למניעת עומס על הלב.

▼ בהוצאת הברנולה יש ללחוץ על מקום הדקירה כ-60 שניות על מנת למנוע דימום או שטף דם מקומי.

▼ בעת השחרור תקבל הסבר על אפשרות לתגובה אלרגית מאוחרת. באם תופיע יש לפנות למוקד רפואי.

▼ תוזמן לבדיקת רופא ובדיקת ספירת דם.

▼ משך הטיפול הכולל הוא כ-4 שעות.