

תפירת צוואר הרחם



חשוב
לדעת



לניאדו
מרכז רפואי צאנז

שׁוֹמֵ אֶרֶץ,
 הוֹצֵאתָ אֶתְּחִילֵי יְשׁוּעָה לְפָנֶיךָ וְעַתָּה הוֹצֵאתָ אֶתְּחִילֵי
 הַחַסְדִּים בְּפָנֶיךָ וְעַתָּה הוֹצֵאתָ אֶתְּחִילֵי הַחַסְדִּים בְּפָנֶיךָ.

אי ספיקת צוואר הרחם

אי ספיקת צוואר הרחם הינה מצב שבו הרחם אינו מסוגל לשמור על מצבו הסגור בזמן הריון. ניתן לטפל במצב ע"י השמת תפר בצוואר בשבוע 12-14.

מהלך הפעולה והתאוששות

משך הפעולה כמחצית השעה ומתבצעת בחדר ניתוח בהרדמה כללית או איזורית. בתום הפעולה תועברי למחלקת נשים, שם ימשיכו ויעקבו אחר לחץ דם, דופק, אומדן כאב ודמם. במחלקה יבוצע אולטרא-סאונד ובסיומו תוכלי להשתחרר.

המלצות לשחרור

- ▼ חשוב להקפיד על היגיינה אישית.
- ▼ ייתכן דמם קל למספר ימים.
- ▼ ייתכנו כאבים. ניתן לקחת משככי כאבים ע"פ הצורך.
- ▼ כלכלה - אין הגבלה.
- ▼ מנוחה - 3 ימים.
- ▼ יש להימנע מקיום יחסי אישות עד גמר הדימום.
- ▼ ביקורת רופא מטפל כעבור שבועיים.

במידה ויופיעו כאבים חזקים, חום, דמם חזק או כל דבר שנראה חריג, יש לחזור למיון נשים בבית חולים לניאדו (בניין מרכזי, קומה ג'). טלפון: 09-8604724.



**בברכת בריאות טובה,
מחלקת נשים**
טלפון: 09-8604724
פקס: 09-8609541
אתר: www.laniado.org.il

©זכויות שמורות לבית חולים לניאדו



www.laniado.org.il | 09-860-47-36

www.laniado.org.il | 09-860-46-66 | רחוב דברי חיים 16 קרית צאנה, נתניה