

ATEZOLIZUMAB


טיסנטריק-TECENTRIQ

חשוב
לדעת!



מהי התרופה וכיצד היא פועלת?

TECENTRIQ (אטזוליזומאב/טיסנטריק) היא תרופה אימונותרפית, שהחומר הפעיל שלה הוא נוגדן חד-שבטי מהונדס מסוג מעכב **PD-L1** התרופה נקשרת לחלבון **PD-L1** המצוי על פני התא הסרטני וחוסמת אותו, כך מתאפשר למערכת החיסון לזהות את התאים הסרטניים, לפעול כנגדם ולהשמידם



התוויה:

טיסנטריק משמשת לטיפול בסוגים מסויימים של סרטן השד, סרטן הריאה וסרטן דרכי השתן.

אופן נטילת התרופה

אטזוליזומאב ניתנת בעירוי תוך ורידי, אחת לשלושה שבועות. הטיפול הראשון ניתן במשך כשעה, ובמידה והתרופה מתקבלת היטב בגוף, הטיפולים הבאים ניתנים במשך כחצי שעה.

תגובה לעירוי

העירוי עלול לגרום לתגובות שונות - צמרמורות, חום, גרד, הסמקה, קוצר נשימה, סחרחורת והתנפחות של הפנים.

יש לדווח לצוות המטפל אם אתה חש באחת מתופעות אלו במהלך מתן העירוי.

ליידע את הרופא המטפל לפני תחילת הטיפול על כל הרשומים מטה:

- רקע ברפואי (מחלות, תרופות שניטלות באופן קבוע ורגישות לתרופות)
- יש לפרט בפני הרופא המטפל את כל התרופות שהנך נוטל/ת, לרבות תרופות מרשם וללא מרשם, ויטמינים ותוספי תזונה צמחיים.
- יש לדווח לרופא המטפל על:
 - בעיות במערכת החיסון, מחלת קרוהן, דלקת כיבית של המעי הגס או זאבת,
 - בעיות ריאתיות או בעיות בנשימה.
 - בעיות בכבד.
- מצבים המשפיעים על מערכת העצבים (חולשת שרירים חמורה כדוגמת מיאסתניה גרביס או תסמונת גיליאן-בארה).
- אם עברת השתלת איבר.
- אם הנך מטופל/ת בשל זיהום כלשהו.

- אם הנך בהיריון או מתכננת להרות (טיסנטריק עלולה לפגוע בעובר).
- עלייך להשתמש באמצעי יעיל למניעת היריון לאורך הטיפול ובמשך 5 חודשים לפחות מיום מתן המנה האחרונה של טיסנטריק.
- אם הנך מיניקה או מתכננת להניק (לא ידוע אם טיסנטריק עוברת לחלב אם ולכן אין להניק במהלך הטיפול ובמשך 5 חודשים לפחות מיום מתן המנה האחרונה).
- אין לקבל טיסנטריק אם את/ה רגיש/ה לאטזוליזומאב או לכל אחד ממרכיבי התרופה

תופעות לוואי אפשריות:

טיסנטריק עלולה לגרום למערכת החיסון שלך לתקוף איברים ורקמות בריאות באזורים רבים של הגוף ועלולה להשפיע על אופן פעולתם ומכאן תופעות הלוואי.

בחילות / הקאות

תסמינים אלו עלולים להתחיל מיד לאחר הטיפול ומספר ימים לאחריו. יש לקחת ע"פ הצורך: TAB. PRAMIN 10 mg אם לא ניתן לשלוט בבחילה או שהיא נמשכת, יש לדווח לצוות לצורך קבלת תרופה יעילה יותר עבורך.

להלן מספר המלצות להפחתה או מניעה של בחילות ו/או הקאות:

- המנע ממאכלים שעלולים להחמיר את התסמינים, כמו מאכלים שומניים, חריפים או חומציים (לימונים, עגבניות, תפוזים).
- נסה לאכול ארוחות קטנות כל כמה שעות וללעוס היטב, ולצרוך מזונות קרים או בטמפרטורת החדר.
- נסה להשתמש בכדורים נוגדי צרבת, לאכול קרקרים או טוסט, לשתות משקה עם נענע או ג'ינג'ר, ולהשתמש בשורש ג'ינג'ר טרי טחון במזון, או בג'ינג'ר מסוכך.
- היעזר בגישות טיפוליות שאינן תרופתיות המגבירות את מידת השקט הנפשי, כגון דיקור או דמיון מודרך.

עצירות

קיימת אפשרות שתסבול מעצירות. ניתן להקל על התופעה באמצעות שתייה מרובה של נוזלים, תוספת של סיבים תזונתיים למזון, ופעילות גופנית מתונה. ייתכן שתצטרך ליטול תרופות משלשלות לטיפול בבעיה. תוכל לרכוש את התרופות בבית המרקחת גם ללא מרשם רופא. עדכן את הרופא אם אתה סובל מעצירות הנמשכת יותר מיומיים-שלושה.

תשישות ועייפות

חשוב להקדיש זמן למנוחה, כמו גם לנסות לאמץ פעילות גופנית מתונה, כגון הליכות קצרות.

דלקת בדרכי השתן

במידה ואתה חש צריבה, דחיפות או תכיפות במתן-שתן, יש לדווח לצוות המטפל לצורך בדיקת שתן מיידית ומתן טיפול בהתאם לנמצא.

חוסר תיאבון

התרופה עלולה לגרום לאובדן תיאבון. נסה לאכול ארוחות קטנות באופן סדיר. אל תדאג אם תאכל מעט יחסית במשך יום או יומיים. אם לאחר מכן לא חל שיפור בתאבון שלך, מומלץ ליצור קשר עם האחיות או הדיאטנית במחלקה. הן יוכלו לתת לך עצות מעשיות בכדי להתמודד עם תופעה זו.

תגובות של מערכת החיסון

אטזוליזומאב מעוררת את מערכת החיסון במטרה לתקוף את הגידול הסרטני, אך עלולה גם לתקוף איברים ורקמות בריאים בגוף. להשפיע על אופן פעולתם ומכאן תופעות הלוואי. קבלת טיפול רפואי באופן מידי עשויה למנוע החמרה של בעיות אלו. אם הנך סובלת מתופעות לוואי חמורות הרופא המטפל עשוי לדחות או להפסיק מיידית את הטיפול בטיסנטריק או לתת לך תרופות נוספות למנוע

סיבוכים ולהפחית תסמינים.

על כן יש לדווח מיידית לצוות במקרים הבאים:

דלקת בריאות (פנאומוניטיס).

הסימנים והתסמינים עלולים לכלול שיעול חדש או שיעול ההולך ומחמיר, קוצר נשימה וכאבים בחזה.

דלקת כבד (הפטיטיס).

הסימנים והתסמינים עלולים לכלול הצהבה של העור או של לחמיות העיניים, בחילה קשה או הקאות, כאב בטן מצד ימין, נמנום, שתן כהה (בצבע תה), דימום או היווצרות חבורות (המטומות) בקלות רבה יותר מהרגיל וירידה בתיאבון, המתבטאות בכאבים בבטן התחתונה, שלשולים, התכווצויות, צואה רירית, כהה או דמית, חום.

דלקת במעיים (קוליטיס). הסימנים והתסמינים עלולים לכלול שלשול (צואה מימית) או תנועת מעיים מוגברת, דם או ריר בצואה, צואה דמית או שחורה ודביקה, כאב חזק או רגישות בבטן.

בעיות בבלוטות ההורמונליות

במיוחד בלוטת יותרת המוח, בלוטת התריס, בלוטת האדרנל והלבלב. הסימנים והתסמינים: כאבי ראש מתמשכים או חריגים, עייפות קיצונית, עלייה או ירידה במשקל, סחרחורת או התעלפות, תיאבון או צימאון מוגבר, נשירת שיער, שינויים במצב הרוח או בהתנהגות (כגון ירידה בחשק המיני, עצבנות יתר או שכחנות), תחושת קור, עצירות, קול עמוק יותר, מתן שתן בתכיפות מוגברת, בחילות או הקאות וכאב בטן.

בעיות באיברים אחרים

- **דלקת שריר הלב (מיקרדיטיס)**-המתבטאות בכאבי חזה, דפיקות לב ואי-סדירות קצב לב, קוצר נשימה. במקרה שמופיעים אחד או

- יותר מסתמינים אלה, יש להגיע בהקדם לביה"ח.
- **דלקת שרירים (מיזיטיס)**- יתבטא באבי שרירים בכל הגוף.
 - **דלקת כליות (נפריטיס)**-יתבטא בכאבים באיזור המותניים.
 - **בעיות במערכת העצבים** - (ניורופתיה או דלקת במוח וברקמות ההיקפיות) - המתבטאות בתחושת חולשה בזרועות, ברגליים או בפנים, חוסר תחושה או עקצוץ בכפות הידיים או הרגליים, חום, בלבול, שינויים במצב הרוח או בהתנהגות, רגישות לאור וקשיון העורף.
 - **בעיות מערכת הראיה**-המתבטאות בראייה כפולה או מטושטשת, צריבה או כאבי עיניים, או עיניים אדומות.
 - **בעיות נירולוגיות** - חולשת שרירים חמורה, חוסר תחושה או תחושת נימול בידיים או ברגליים, בלבול, ראייה מטושטשת, ראייה כפולה, או בעיות ראייה אחרות, שינויים במצב הרוח או בהתנהגות, רגישות קיצונית לאור, קישיון עורף.
 - **בעיות עור וריריות** - כאב או אדמומיות בעיניים, שלפוחיות או קילופים בעור, גרד, אודם או רגישות בעור.
 - **בעיות במערכת הנשימה** - קוצר נשימה
 - **בעיות נוספות / אחרות** - נפיחות בקרסוליים, שינויים בצבע השתן או כאב באגן.

יש לדווח לצוות הרפואי המטפל בך אם אתה חש באחד מהבאים:

- כאבי ראש
- בחילות, הקאות
- עייפות קיצונית
- חולשה
- שינויים בזיכרון ובריכוז
- עליה במשקל
- סחרחורות
- תחושת קור תמידית
- שינויי מצב רוח והתנהגות (לרבות עצבנות, בלבול וירידה בחשק המיני)
- תיאבון או צמא מוגברים
- מתן שתן מוגבר מהרגיל.

במקרים בהם מופיעים תסמינים קשים, יש להגיע לבית החולים.

- **זיהומים חמורים**-הסימנים והתסמינים עלולים לכלול חום, שיעול, מתן שתן תכוף או כאב גב, תסמינים דמויי - שפעת וכאבים במתן שתן. המתבטאים בחום מעל 38°C , תסמינים דמויי שפעת, שיעול ממושך, צריבה ותכיפות גבוהה במתן שתן, או כאב שאינו חולף.
- **תגובות עוריות**- יש לדווח לצוות המטפל על כל פריחה שמופיעה בעור עם או ללא גרד, פצעים בפה, שלפוחיות או התקלפויות של העור, מאחר ואלו עלולים להיות תסמינים חמורים הדורשים טיפול סטרואידי.
- **תגובות עירוי חמורות**- הסימנים והתסמינים עלולים לכלול צמרמורת או רעידות, גרד או פריחה, הסמקה, קוצר נשימה או צפצופים בנשימה, סחרחורת, חום, תחושת עילפון, כאב בצוואר או בגב והתנפחות של הפנים או השפתיים.תופעות הניתנות לשליטה מלאה ע"י מתן

סטרואידיים במקרים החריפים.

- **פוריות**-התרופה עלולה להשפיע על פוריות גברים ונשים. מומלץ להתייעץ בנושא זה עם הרופא המטפל כך - לפני תחילת הטיפול.
- **מניעת הריון**-מומלץ לא להכניס או להיכנס להריון בזמן נטילת אטזוליזומאב ובמהלך חמישה חודשים לפחות לאחר סיום הטיפול, מאחר ועלול להיגרם נזק לעובר המתפתח. מומלץ להתייעץ בנושא זה עם הרופא המטפל כך - לפני תחילת הטיפול.
- **אמצעי מניעה**-הטיפול בתרופה עלול לפגוע בתינוק המתפתח, ולכן יש להקפיד על שימוש באמצעי מניעה (קונדום) החוסם את מעבר נוזלי הזרע והנרתיק בזמן השימוש בתרופה ולפחות 5 חודשים לאחר סיום הטיפול.

אנשי קשר בשעת חרום

מכון אונקולוגי: טלפון - 09-8604716 פקס - 09-8609252

בימים א'-ה' שעות: 08:00-16:00

זיה חנוכה: אחות אונקולוגית במכון אונקולוגי לניאדו

פלאפון: 052-3433188



**הצוות האונקולוגי עומד לרשותך
לייעוצים טלפונים במקרים דחופים
גם מחוץ לשעות הפעילות**

מנהל המכון האונקולוגי:
ד"ר ניל פרידמן

אחות אחראית:
חנוכה זיוה נייד: 052-3433188

עובדת סוציאלית:
צדוק מעיין נייד: 052-5287246

יחידה אונקולוגית לניאדו:
טל: 09-8604716, פקס: 09-8609252
שעות פעילות בימים א', ב', ג', ה'. בשעות: 8:00-16:00

בברכת החלמה מהירה!

© כל הזכויות שמורות לבית חולים לניאדו
נכתב על ידי גב' זיוה חנוכה, אחות אחראית במכון האונקולוגי, ב"ח לניאדו



hematolog@laniado.org.il

09-860-47-36

www.laniado.org.il | 09-860-46-66 | רחוב דברי חיים 16 קרית צאנז, נתניה